

L'évolution des sommes de températures se ralentie

25-févr-24



Station automatique météo-France	Somme des températures en °C (Base 01/02)	Somme des températures au 25 février 2023 (Base 01/02)	Moyenne somme des températures au 25 février sur les 5 dernières années (Base 01/02)	Précipitations la semaine dernière (du 19 au 25 février)
AUBUSSON	187	128	169	24,4
AUZANCES	180	125	167	15
BENEVENT	187	169	204	45,2
BONNAT	204	--	--	30
BOURGANEUF	182	158	191	64
BOUSSAC	194	131	180	17,6
CHAMBONCHARD	199	141	182	16
CROCQ	169	--	--	27,8
DUN LE PALESTEL	201	--	--	32,6
FELLETIN	178	152	184	29,4
GENOUILLAC	206	146	188	25,6
GENTIOUX	149	126	151	59,2
GUERET - ST LAURENT	198	--	--	30,3
LA COURTINE	151	106	139	45,4
LA SOUTERRAINE	196	174	210	41
LUPERSAT	185	--	--	20,2
PONTARION	192	--	--	54,4
SAINTE LOUP	194	144	189	23,6

Pour rappel, le prochain repère de la gestion de l'herbe c'est la mise à l'herbe à 300°C (base01/02)
=> On identifie ses parcelles de fauche (La Surface Complémentaire)

La Surface Complémentaire (ou surface de fauche) est estimée à partir des besoins des animaux et des rendements des parcelles. Quand l'alimentation hivernale est à base de foin, d'enrubannage ou d'ensilage d'herbe, elle correspond en système bovin, en moyenne à 50% de la Surface Totale en Herbe. En production ovine, elle varie de 30% en système d'agnelage de printemps, à 50% en système d'agnelage automne-hiver.

Si l'on prend soin de réserver 30% de la Surface Complémentaire en fauche précoce (début épiaison), on assure une repousse affectable au pâturage ou à une fauche en regain.

Les besoins en stocks des animaux varient entre 2 et 2,5 tMS. Il convient aussi de vérifier que l'estimation du rendement des fauches est en mesure de satisfaire les besoins en stocks des troupeaux.