

04-juin-23



Station automatique météo-France	Somme des températures en °C (base 01/02)	Niveau de remplissage des Réserves Utiles (Sol léger RU 45 mm)	Niveau du stress hydrique (en %)	Niveau de remplissage des Réserves Utiles (Sol moyen RU 75 mm)	Niveau du stress hydrique (en %)
AUBUSSON	1257	0%	98%	5%	81%
AUZANCES	1209	1%	88%	8%	64%
BENENVENT	1373	0%	56%	4%	48%
BOURGANEUF	1323	16%	0%	24%	0%
BOUSSAC	1304	0%	99%	4%	86%
CHAMBONCHARD	1340	27%	0%	26%	0%
LA COURTINE	1090	12%	48%	42%	0%
FELLETIN	1261	37%	0%	62%	0%
GENOUILLAC	1342	0%	58%	1%	57%
GENTIOUX	1123	18%	18%	49%	0%
LA SOUTERRAINE	1396	78%	0%	49%	0%

Durée de vie des feuilles :

RGA :

500°C

Dactyle et fétuque :

800°C

Fétuque rouge :

860°C

Du foin jusqu'à 1400°C

La saison des foins est lancée sur le département. Les récoltes s'annoncent correctes dans l'ensemble. Il faut surveiller la **fraicheur matinale** et les **pluies orageuses** qui peuvent venir **impacter et/ou retarder** les chantiers de récolte du foin.

Passer le **cumul des 1400°C** la **qualité du foin est mauvaise** car le cycle de la plante se termine, c'est la période de l'égrainage et donc l'herbe est « mûre ».

Au niveau du pâturage

Les deux premiers cycles de pâturage se sont terminés et des refus peuvent apparaître. Pour faciliter une repousse, le **fauchage de ces refus est envisageable**.

Dorénavant, la gestion du pâturage se gère en **fonction de la durée de vie des feuilles**. Le but est de **faire pâturer des feuilles vivantes**, donc vertes, avant la sénescence (*mort naturelle de la feuille*).

Les règles du pâturage ne changent pas :

- Temps de séjour par paddock = **3 à 8 jours**
- Temps de repos et de repousse par paddock = **minimum 25 jours**
- **Minimum de 5 paddocks en pâturage tournant**

Alexis DESARMENIEN

Conseiller Herbe & Fourrages

05 55 61 50 06

alexis.desarmenien@creuse.chambagri.fr